

# 立百病毒感染症病例定義

## (Nipah Virus Infection)

### 一、臨床條件

同時具有急性發燒 ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) 和下列任一個條件：

- (一) 神經系統：頭痛、嘔吐、抽搐、精神症狀(譫妄、意識不清等)。
- (二) 呼吸系統：咳嗽、呼吸急促。

### 二、檢驗條件

具有下列任一個條件：

- (一) 臨床檢體分離並鑑定出立百病毒 (Nipah virus)。
- (二) 臨床檢體分子生物學核酸檢測陽性。
- (三) 血清學抗體檢測陽性。

### 三、流行病學條件

發病前 21 日內，具有下列任一個條件：

- (一) 曾經與極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有血液、呼吸道分泌物、體液或其污染物之直接接觸。
- (二) 具有立百病毒感染症疫情流行地區之活動史。
- (三) 具有立百病毒感染症流行地區動物 (例如蝙蝠、豬隻等) 或其體液 (血液、尿液、唾液等) 之接觸史，或曾食用其污染的食物 (椰棗汁、水果等)。
- (四) 無適當防護下進行立百病毒或檢體之實驗室操作。

### 四、通報定義

具有下列任一個條件：

- (一) 符合臨床條件及流行病學條件。

(二) 符合檢驗條件。

## 五、疾病分類

(一) 極可能病例：

雖未經實驗室證實，但符合臨床條件及流行病學條件。

(二) 確定病例：

符合檢驗條件。