

守護

媽媽與寶寶的健康

孕期梅毒預防、篩檢和治療



什麼是梅毒?

- 梅毒是由梅毒螺旋體引起的感染，主要透過性接觸傳染。
- 孕婦感染梅毒若未及時治療，可能會傳染給胎兒，造成先天性梅毒，並增加流產、死產、早產、寶寶體重過輕及腦部或骨骼異常等風險。



成人梅毒各期常見症狀

第一期梅毒



常見為
無痛性潰瘍

第二期梅毒



出現全身性皮疹、
手掌腳掌紅疹、發燒、
淋巴腫大、禿髮

第三期梅毒



影響心血管系統、
神經系統、
梅毒腫

孕期梅毒篩檢

- 定期產檢及接受梅毒檢查（孕期12週及32週時會篩檢）
- 若檢查結果為陽性，應儘速接受醫師評估與治療，同時預防寶寶感染
- 即使檢查為陰性，若仍有不安全性行為（未使用保險套之性行為）或有疑似症狀，請儘速就醫評估及再次接受梅毒檢查，保護自己與寶寶健康

如何預防梅毒感染?

- 性行為全程使用保險套、搭配水性潤滑液（懷孕也請遵守安全性行為，預防感染性病）
- 若發現感染梅毒，配偶或性伴侶應一同接受檢查與治療，避免乒乓感染



如果感染梅毒，
不必驚慌！

請務必依照醫師指示完成療程，切勿自行買藥服用!!

- 及早接受治療可降低胎兒感染梅毒風險
- 多數孕婦經適當治療後可以順利生下健康寶寶
- 請依醫師指示回診追蹤



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

廣告